

Restablecimiento de la actividad en los servicios de Digestivo. Recomendaciones de la AEEH, AEG, GETECCU y SEPD

Recomendaciones en hepatología. Fases del reinicio de la actividad

Fase I

CONSULTAS DE HEPATOLOGÍA

- Pacientes en lista de trasplante hepático/pacientes en estudio pre-trasplante hepático.
- Hepatocarcinoma pendientes de tratamiento.
- Pacientes con cirrosis hepática descompensada en seguimiento o de reciente diagnóstico en planta.
- Pacientes post-trasplante hepático e ingreso reciente que requieran valoración precoz en consulta
- Continuar con consultas telemáticas para establecer la prioridad para ser atendido en consultas externas.

PRUEBAS ENDOSCÓPICAS

- Programa de ligadura por varices esofágicas.

BIOPSIA HEPÁTICA

- Alteración de las transaminasas (> 5 ULN) que requieran diagnóstico etiológico.
- Pacientes con nódulos hepáticos sospechosos
- Trasplantados hepáticos con sospecha de rechazo agudo/crónico.

HEMODINAMICA PORTAL

- Biopsia hepática en insuficiencia hepática aguda grave
- Colocación TPIS urgente

TRATAMIENTOS

- Tratamiento percutáneos, Quimioembolización y radioembolización de pacientes con hepatocarcinoma no tratados.

Fase II

CONSULTAS DE HEPATOLOGÍA

- Pacientes nuevos previa valoración por hepatólogo que requieran evaluación preferente.
- Seguimiento primer año hepatocarcinoma.
- Consultas telemáticas de los pacientes que se hayan realizado ecografía abdominal como seguimiento de su cirrosis hepática pendiente de realización.
- Consultas telemáticas de seguimiento por hepatocarcinoma sometido a tratamiento local que realicen seguimientos trimestrales con RM hepática.

ECOGRAFÍA ABDOMINAL

- Ecografía doppler abdominal de pacientes con fibrosis avanzada canceladas por pandemia.
- Ecografía doppler abdominal de pacientes con hepatopatía de reciente diagnóstico.

PRUEBAS ENDOSCÓPICAS

- Pacientes que se realizan gastroscopia para el diagnóstico de varices esofágicas.

BIOPSIA HEPÁTICA

- Pacientes con elevación de transaminasas (2-5 ULN) que requieran diagnóstico etiológico.
- Pacientes con sospecha de fibrosis avanzada

HEMODINAMICA PORTAL

- Medición gradiente presión portal en pacientes con hepatocarcinoma subsidiarios de resección hepática

Fase III

CONSULTAS DE HEPATOLOGÍA

- Pacientes nuevos.
- Pacientes con hepatopatías que no estén en fase de fibrosis avanzada en seguimiento.

ECOGRAFÍA ABDOMINAL

- Ecografía doppler abdominal de pacientes con fibrosis avanzada.
- Ecografía doppler abdominal que se realicen como seguimiento de hepatopatía crónica sin fibrosis avanzada.

BIOPSIA HEPÁTICA

- Biopsia hepática para el diagnóstico de pacientes con EGHNA con sospecha de esteatohepatitis no alcohólica y fibrosis hepática.
- Biopsia hepática para diagnóstico etiológico de hepatopatías

HEMODINAMICA PORTAL

- Todas las indicaciones habituales

“Restablecimiento de la actividad en los servicios de Digestivo. Recomendaciones de la AEEH, AEG, GETECCU y SEPD”
Artículo prepublicado en Pubmed y en la REED con DOI.